

**RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO 2005.
SE INDICA: TITULO, AUTORES, FECHA DE INICIO.
FECHA DE CULMINACIÓN Y PRESUPUESTO.**

FACULTAD DE: ODONTOLOGIA

Nº	TITULO	AUTOR(ES)	FEC. INIC.	FEC. FIN.	PRESU PUEST O	OBSERVACIONES
1.	La Altura Labial Superior e Inferior en la Determinación del Tercio Inferior de la Cara en Pacientes de 18 a 60 años de edad que asisten a la clínica Odontológica de la Ciudad Universitaria de la UNICA	Lic. Alfredo Alatriza Alvarez. C.D. Silverio Alejo Huamaní	01/05	12/06	3,845	La lesiones diarias más frecuentes en los ancianos de los asilos San Juan de dios y Vargas Prada de Ica son lengua Geografica saburral, fisura 91.30%, varices 60.87% gingivitis 43.48% Las regiones más frecuentes mas afectadas por las diferentes lesiones son lengua, labios y encias. No existen diferencias significativas entre las frecuencias de las lesiones y el sexo.
2	Diagnostico de Salud Oral en Estudiantes de Secundaria del IE "San Luis Gonzaga de Ica y de Nuestra Señora de la Mercedes Ica Perú	C.D. Cirilo Rojas Bernaola C.D. Juan Mayaute Ghezzi.	01/05	12/06	3,625	En la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes Se evaluaron 50 pacientes, siendo el promedio CPOD de 8.66 y el HHB_ S de En el primer año se evaluaron 13 pacientes, siendo el promedio del CPOD de 7.23 my el promedio del indice de Higiene Oral Simplificado de 1.68 En el Segundo año se evaluaron 10 pacientes siendo el promedio del CPOD de 9.22 y el promedio del Índice Higiene oral simplificado de 1.69
3	La altura Labial Superior e Inferior en la Determinación del Tercio Inferior de la Cara en Pacientes de 18 a 60 años de Edad que asisten a la clínica Odontológica de la UNICA	C.D. Romualdo Gonzales C.D. Carmen Chang Vera.	01/05	12/06	S/m	Sin conclusiones

4	Morbimortalidad en Pediatría Hospital Regional de Ica.	Mg. Narciso Eusebio Aliaga Guillen	01/05	12/05	1,900	<p>La Tasa de mortalidad es baja, 10 x 1,000 nacidos vivos.</p> <p>La morbilidad es alta, 30% de niños afectados, con predominancia de las patologías respiratorias y digestivas que en forma sumatoria represente el 93.32% del total de niños afectados.</p> <p>La desnutrición es relativamente baja, con un 32%, comparándose con el porcentaje nacional que es del 48.5%.</p> <p>El desarrollo psicomotor es deficitario en el 14.5%</p> <p>El retardo en el crecimiento y desarrollo, el alto 11%, en referencia a los porcentajes nacionales (9%).</p>
5	"Obturaciones defectuosas con amalgama en cavidades clase ii según black observadas Radiográficamente en los pacientes que acuden a su tratamiento en la clínica de la facultad de odontología de la Universidad nacional san Luis Gonzaga de Ica en el periodo 2005 "	C.D. Lara Hualcca C.D. Gladis Rosario Huamán Espinoza C.D. Jorge Torreblanca del Carpio.	02/05	01/06	5,200	<p>Que los pacientes que acudieron a la clínica Odontológica para recibir tratamiento de operatoria con obturaciones de amalgama de clase II según Black al ser observadas radiográficamente concluimos que verificamos la hipótesis que el 35% de los pacientes que acudieron a nuestra clínica recibieron obturación con amalgama defectuosas.</p> <p>Que radiográficamente fue elevada de obturaciones de amalgama defectuosas en cavidades de II clase de Black, considerando tres defectos falta de contacto proximal, falta de sellado marginal y sobre obturación.</p> <p>Dentro la alteración de los contornos proximales, el tipo de defecto más frecuente es la sobre obturación marginal ; le siguió en orden la alteración por falta sellado del margen gingival y la falta de relación de contacto deficiente.</p>

6	Evaluación Radiográfica de Piezas Multiradiculares Obturadas con la Técnica de Condensación Lateral en Clínica Odontológica de la UNICA 1998 – 2004.	C.D. Carmen Luisa Chauca Saavedra. Mg. Liliana Diaz Núñez. Mg. Andres Ramos Sayritupac.	02/05	01/06	g3,128	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la clínica de la Facultad de Odontología- UNICA, se demostró que solamente en piezas multiradiculares superiores se trabajó UN 41.25 % y en piezas multiradiculares inferiores un 58.75 %. ✓ Durante la evaluación de los exámenes de ayuda para el diagnóstico (radiografías periapicales), se observó el límite apical, por lo cual podemos decir que las piezas dentarias obturadas adecuadamente representan un 43.33% ; las piezas dentarias sobreobturadas representan un 27.97% las piezas dentarias con obturación sobrestendidas representan un 28.75% ✓ El uso de la técnica de condensación lateral , a la observación radiográfica se observó con homogeneidad un porcentaje de 33.33% , también se observó espacios vacíos en un 66.66%
7	Estudio Radiográfico del conducto de Seres y su Relación con el conducto mandibular En Especímenes Óseos Infantiles	C.D. Edgar Hernández Huaripaucar C.D. Oliver Gonzales Aedo C.D. Carlos H. Suarez Urbano.	02/05	01/06	6,797	<p>De los 45 especímenes, 21 presentaron conducto de serres (CS) unilateralmente, 21 casos bilateralmente y en tres casos estuvo ausente dicho conducto.</p> <p>La Longitud del C. S tipo largo fue más frecuente en el grupo infantil mayor (derecho) y en el infantil intermedio izquierdo la longitud tipo media fue más frecuente en el grupo infantil menor tanto en lado derecho (41.7%) como en el izquierdo.</p> <p>La distancia inicial del C.S. al C.M. fue proporcionalmente mayor en el grupo infantil mayor (70%) y en el rendimiento de 0.5 a 1.79 m.m. en el lado derecho mientras que en el lado izquierdo la mayor proporción recayó en el grupo infantil intermedio (55.6%) y en el intervalo de 2 a 3.5 m.m.</p>

8	Enfoque Oclusal de la Dentición Decidua como Parámetro de Futuras maloclusiones	C.D. María Elena Huamán Bonifaz C.D. Enrique Cuba Greco C.D. Betzabe Zuloeta Hurtado.	02/05	01/06	2,186.	<p>En la dentición temporal fue muy frecuente encontrar en los niños de 4 y 5 años el Over bite y Over jet de 1 a 2 mm. Respectivamente, encontrándose en un rango (-1 a 3) entre los valores estándares para una oclusión adecuada, a excepción de 2 niños que presentaron el valor de -1.</p> <p>En la relación canina de tipo Recto es el más frecuente 85.4% en 4 años y el 84.6% en nos de 56 años. Mayormente en varones con un 89.7%</p> <p>En la relación molar se presenta en mayor frecuencia el escalar recto con el 75% en los niños de 4 años y el 77% en 5 años Mayormente lo presentaron los valores con el 84.5%</p>
9	Estado Bucal en Pacientes portadores de Prótesis total en el Pueblo Joven señor de los Milagros.	C.D. Roberto Castañeda terrones C.D. Rosa Linda Salazar Cayo.	02/05	01/06	6,670	<p>La muestra (N = 30) de pacientes portadores de prótesis total estuvo conformada por un 60% de femeninos y por el 40% de masculino del total de la muestra todas presentaban alguna alteración de la mucosa.</p> <p>El grupo más afectado fue la presencia de alteraciones de la mucosa fue el de 66 a más con el 44.1% en este grupo, la hiperplasia fibrosa inflamatoria, tuvo mayor presencia con el 20.5% en relación a la muestra estudiada (N = 34). Los grupos de 35 – 45 y 56 – 65 fueron los que tuvieron menos incidencia de alteraciones de la mucosa oral (11.76%)</p> <p>La H.F.I. fue la lesión que se presento con mayor frecuencia con el 35%, seguida de la queilitis angular con el 29%, cave indicar que en nuestro estudio no se reportó ningún caso de Leucoplasia, que la candidiasis pseudo-membranosa fue la lesión con menor frecuencia (5.8%).</p>

10	Síndrome Febril Como factor de Riesgo para Herpes Labial recurrente en Pacientes de Clínica de Diagnostico Integral del Adulto I II Perú 2005 – 2006	C.D. Julio Humberto Lavado Muñoz.	03/05	02/06	4,160	<p>En los 100 pacientes examinados en la clínica de diagnostico integral del adulto I II de la clinica de la Facultad de odontológica, se observaron 33 examinados con herpes labial recurrente en asociación a síndromes febril (hipertemia $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$), lo que representa un 33.0% de los examinados, de otro lado se reporta una prevalencia del síndrome febril del orden de 66.0% en los casos.</p> <p>En lo que se refiere al numero de examinados sin manifestaciones de herpes labial recurrente y expuestos al factor de riesgo (síndrome febril), registramos una prevalencia del 21.0% y en cuanto a la prevalencia del factor de riesgo (síndrome febril) en los controles, registramos una prevalencia del 42.0%</p>
11	Evaluación Bacteriológica del Efecto Antimicrobiano de la Clorhexidina al 0.12% Durante el Tratamiento de Conductos Radiculares con Necrosis Pulpar.	Mg. Víctor Gallegos solis Mg. Felicita Villavicencio Medina. Mg. Juan Guillermo Albitres	03/05	02/06	3,000	<p>El tipo de microorganismos que prevalece en los productos radiculares antes de irrigar con clorhexidina al 0.12% es el Streptococcus s. Y los bacteroides; de 10 conductos evaluados se encontraron Streptococcus ap en 5 conductos y bacteroides en 6 conductos.</p> <p>Las formas microbianas que persisten en los conductos radiculares después de haber irrigado con Clorhexidina al 0.12% son las formas bacteroides y bacillus sp.</p> <p>Las formas microbianas que no persistieron en los conductos radiculares después de haber sido irrigados con Clorherxidina al 0.12% fueron los Streptococcus sp y la cándida.</p>

12	Salud Gingivodentaria en Pacientes Niños de 6 a 12 años de edad, en el Hospital Santa María del socorro de Ica periodo 2005.	D.C Carmen Bohórquez Mendoza	03/05	02/06	22,667.	<p>La prevalencia de piezas cariadas es similar para ambos sexos (50%sexo masculino y femenino); la prevalencia de piezas obturadas es mayor para el sexo femenino (69%) en relación al sexo masculino (31 y la prevalencia de piezas perdidas es mayor para el sexo masculino (54%) en relación al sexo femenino (46%)</p> <p>Los porcentajes de piezas dentarias a extraer es exclusivo del sexo masculino, representando el 100% de la muestra; el porcentaje de encia sana en la muestra investigada fue del 64.01% presencia de hemorragia al sondeo en el 26,77% y presencia de calculo en el 0,41% de la muestra; y el porcentaje de presencia de bolsas periodontales se observó en 38.92% de la muestra.</p>
----	--	---------------------------------	-------	-------	---------	---

13	Prevalencia de Lesiones Blancas en la Mucosa Oral en el Pueblo Joven Santa Rosa de Lima Del distrito y la Provincia de Ica.	C.D. Alejandro Víctor Reyes Uribe C.D. Jorge A. Marticorena Mendoza.	03/05	02/06	S/m.	<p>- Se determinó que el porcentaje de pacientes con candida albicans que tengan lesiones blancas evaluación por sexo:</p> <p>presente o ausente : 2.7%</p> <p>en masculinos : 5.3%</p> <p>en mujeres presente : 92.3%</p> <p>en hombres : 100% ausente en mayores.</p> <p>- Se determinó que la distribución en pacientes con úlcera traumática y tenga presente o ausente lesiones blancas según sexo fue:</p> <p>Masculino presente : 4.5%</p> <p>Femenino : 0%</p> <p>Ausente masculino : 40.9%</p> <p>- Se determinó la distribución de pacientes con candida albicans según la edad presente o ausente lesiones blancas:</p> <p>menor de 50 años presente : 00%</p> <p>de 50 a 69 años presente : 4.7%</p> <p>De 70 a más años presente : 4.3%</p>
----	---	---	-------	-------	------	--

14	Estudio Clínico del efecto de la Bencidamina en la Prevención de la Osteítis Alveolar Dolorosa Post Exodoncia en Pacientes que Acuden a la clínica de la Facultad de Odontología de la UNICA en el 2005	C.D. Víctor cavelero Figari C.D. Luzmila Cabrera Hernandez	04/05	03/06	S/m	<ul style="list-style-type: none"> • En los 254 pacientes atendidos en la clínica de la facultad de Odontología en el Área de Cirugía de la Universidad Nacional san Luis Gonzaga de Ica, la prevalencia fue de 8 pacientes que manifestaron signos y síntomas de osteítis alveolar dolorosa correspondiéndole el 3.1%. • En los 200 de la muestra de pacientes atendidos por exodoncia de piezas dentarias de ambos maxilares la prevalencia de osteítis alveolar dolorosa fue de 8 pacientes que manifestaron signos y síntomas de correspondiéndole el 4.0%. • Con respecto a los 99 pacientes que acudieron a la clínica, al Área de cirugía para recibir tratamiento de Exodoncia y no se hizo uso de antisépticos orales, la prevalencia fue de 5 casos de osteítis alveolar dolorosa el 3.5%
15	Conocimiento y Actividades del Operador del 5to. año de la Facultad de Odontología de la UNICA sobre Ansiedad y el temor del Paciente Durante el Tratamiento Ortodoncia Ica – 2005.	D.C. Fernando Romero Ramos C.D. Lia Chávez Mejía.	06/05	05/07	2,331	<ul style="list-style-type: none"> - El nivel de conocimiento de los estudiantes de Pre grado de la facultad de Odontología de la UNICA es bueno ne lo relacionado a la ansieda y el temor - La actitud que asume los estudiantes de Pre grado de la Facultad e Odontología de la UNICA, es buena porque conceden y aplican procedimientos correctos con relación a la ansiedad y el temos.

16	Condición Periodontal del Paciente Ambulatorio de la Clinica Integral del Adulto I II de Ambos sexos de 19 a 74 años de edad, con hábito de fumar Tabaco y usuario de la Clínica Dental de la UNICA-Perú-2005.	C.D. Leoncio Martín Arizola Junchaya Colaborador C.D. José Magallanes Reyes	06/05	05/07	4,160	<ul style="list-style-type: none"> - El hábito de fumar, se encuentra más acentuado en el sexo masculino. - No existe asociación entre la presencia del hábito de fumar y la condición de higiene dental regular y mala. - Si existe asociación entre los pacientes fumadores de más de cinco años y la condición de higiene dental regular y mala. El hábito de fumar con menos de 5 años se convierte en un cierto factor de protección en no llegar a tener una higiene dental regular y mala. - La placa blanda se encuentra más acentuada en el sexo femenino.
----	--	--	-------	-------	-------	---

17	Condición Clínica del Tercer Molar en Estudiantes de Odontología de la UNICA año 2005.	Mg. Dorka Calderón Gonzáles C.D. Haydee Corrales Valencia.	06/05	05/06	9,580	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presencia clínica de los terceros molares es mayor en el maxilar en ambos sexos, seguido de la mandíbula en el sexo masculino y en menor frecuencia en el femenino. En consecuencia la ausencia del tercer molar es mayor en la mandíbula en el sexo femenino. 2. Se observó que el tercer molar había sido extraído con mayor frecuencia en la mandíbula y en el sexo masculino y en menor frecuencia en el femenino 3. La mayoría de los terceros molares erupcionados estaban en posición vertical en el maxilar en ambos sexos, seguido de los terceros molares mandibulares en ambos sexos. Hay poca frecuencia de terceros molares en posición horizontal, linguoversión, distoangular, vestibuloversión, mesioangular y en proceso de erupción 4. Se presentaron pocos casos de patología macromolar, en el sexo masculino hubo mayor frecuencia y en la mandíbula. 5. Otras patologías como la caries dental fue mas frecuente en el maxilar en ambos sexos, la gingivitis estuvo en mayor frecuencia en el sexo masculino. 6. Casi no se han encontrado casos de terceros molares relacionados con patologías como pericoronaritis, micromolar y dolor sin evidencia clínica
----	--	---	-------	-------	-------	--

18	Estado y Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Población que Acude a la Área de Periodoncia en la Clínica Odontológica de la Facultad de Odontología de la UNICA. 2005	C.D. José Luis Vásquez Rivera.	07/05	06/06	4,752	<p>- Los porcentajes más altos por indicador y promedios por sextantes correspondieron a la presencia de cálculos (código 2), presentando mayormente por el sexo femenino (39.60%), seguido del sexo masculino (34.65%), haciendo ambos un 74.25% del total de muestra estudiada. Ningún grupo de edad presentó bolsas de 6 mm a más (código 4). La necesidad de tratamiento periodontal básica fue la instrucción de higiene oral (NTI) en todos los grupos de edad (85.14%) seguida de destartraje/curetaje (NT II) en todos los grupos de edad (14.85%) sin haber necesidad de tratamiento complejo en ningún grupo de edad (NT III) (0.00%).</p>
19	Trastornos de la Mucosa Oral y su Relación con el Estado de Envejecimiento en Pacientes que concurren a la Clínica Dental de la Sanidad de la Policía Nacional de Ica, Año 2005-2006.	C.D. Freddy Emilio TATAJE NAPURI	09/05	08/06	3,069	<ul style="list-style-type: none"> • El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en pacientes geriátricos que concurren al Servicio Dental de la Sanidad Policial de Ica; para evaluar la relación que existe entre los trastornos en la cavidad oral y el estado de envejecimiento. • Se hace notorio que prácticamente el 98% presentara caries dental; al examen clínico reveló un índice CPO-D de 10.34. • Así mismo este estudio reveló que el 38.43% de los pacientes adultos presentaron gingivitis leve; con gingivitis moderada se presentó en el 17.26% y con ninguna lesión periodontal el 43%. • Así mismo, en este estudio se presentó algún tipo de trastornos de la mucosa oral en un 30.95%; y el 69.05% no presentó ningún tipo de trastorno de la mucosa oral. • Los trastornos de la mucosa oral que se presentaron con mayor frecuencia son las Aftas (155); seguidas de las varicocidades (70) y queilitis angular (52). Se determinó que la mayoría de los pacientes presentaron con mayor frecuencia un trastorno de la mucosa oral.

20	Perfil de Salud Oral de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNICA 2005-2006	C.D. Flores Valenzuela Antonio Félix Mg. Monge Palacios Víctor Alfredo	09/05	08/06	2,228	<ul style="list-style-type: none"> * El presente trabajo se ha titulado: "PERFIL DE SALUD ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNICA. 2005 – 2006" * El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en alumnos de la Facultad de Odontología de la UNICA, en el año 2005 - 2006 con la finalidad de determinar su Índice CPO-D; si presentaban enfermedad periodontal y los posibles trastornos de la mucosa oral presentes. * Se hace notorio que prácticamente el 99.00% presentaron caries, al examen clínico reveló un Índice CPO-D de 10.54 * Asimismo este estudio revelo que el 39.99% de los jóvenes presentaron gingivitis leve; con gingivitis moderada se presento en el 16.56% y sin ninguna lesión periodontal el 43.44%. * Asimismo, este estudio se presento algún tipo de trastornos de la mucosa oral en un 29.65%; y el 70.43% no presento ningún tipo de trastorno de la mucosa oral. * Los trastornos de la mucosa oral que se presentaron con mayor frecuencia son las aftas (155); seguidas de las varicosidades (70) y queilitis angular (52). Se determino que la mayoría de los jóvenes presentaron con mayor frecuencia un trastorno de la mucosa oral.
----	---	---	-------	-------	-------	--

21	La Clorhexidina Como Agente anti placa en el tratamiento periodental en los pacientes atendidos en la clinica Odontológica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 2005-2006	C.D. Huamaní Yupanqui Arnaldo Mg. Saravia Alviar Asela	09/05	08/06	4,731	<p>1.- Que con relación al sexo y la condición asignada no existe ninguna tipo de asociación para la reducción de la placa bacteriana en el análisis de los 40 pacientes.</p> <p>2.- Que la variable edad en toda la investigación y la condición asignada no se puede sacar ninguna conclusión por que más de una celda tiene la frecuencia esperada de menor de 5.</p> <p>3.- Que con relación al sexo y la presencia de placa en el examen inicial de la boca no existe ninguna tipo de asociación para la reducción de la placa bacteriana en el análisis de los 40 pacientes.</p> <p>4.- Que con relación al sexo y la presencia de placa en el examen a los 30 días de la boca no existe ninguna tipo de asociación para la reducción de la placa bacteriana en el análisis de los 40 pacientes.</p> <p>5.- Que con relación a la condición asignada y la presencia de placa en el examen inicial de la boca no existe ninguna tipo de asociación para la reducción de la placa bacteriana en el análisis de los 40 pacientes.</p> <p>6.- Que con relación a la condición asignada y la presencia de placa en el examen a los 30 días si existe asociación para la reducción de la placa bacteriana en el análisis de los 40 pacientes con un nivel de confianza del 95% quiere decir que es significativa.</p>
----	---	---	-------	-------	-------	---

22	Hábitos Orales en Niños de 6 a 12 Años de Ambos Sexos del C.I.E. N° 22570m Urb. Santa María. Ica.	C.D. Thomy Aranzaens Malaga.	10/05	09/06	1,584	<ul style="list-style-type: none"> • La presente investigación se realizó en 142 niños de 6 a 12 años de ambos sexos del C.I.E. N° 142 de la Urbanización Santa María. • La clasificación de las edades fue la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Niños de 6 años 18 → • Niños de 7 años 18 → • Niños de 8 años 19 → • Niños de 9 años 31 → • Niños de 10 años 27 → • Niños de 11 años 18 → • Niños de 12 años 11 → • Los hábitos deletéreos que se presentaron con mayor prevalencia fueron: Mordida de labio (63 niños); Onicofagia (45 niños) y Respiración Bucal (30 niños). • El hábito de Mordedura de labio se presentó con mayor prevalencia en el sexo masculino (40 niños), frente al sexo femenino (23 niñas).
----	---	------------------------------	-------	-------	-------	--

23	Factores que Influyen que los Alumnos del Primero, Segundo y Tercer año de la Facultad de Odontología para no Realizar Trabajos de Investigación.	C.D. Juana Valencia Anchante C.D. Cecilia Solano García C.D. Rosa La Rosa Zapata	11/05	10/06	4,320	<ul style="list-style-type: none"> • El nivel de conocimientos de los estudiantes de primer al 3er año de la Facultad de Odontología de la UNICA, es malo en lo relacionado a los conocimientos de metodología de investigación. • La actitud que asumen los estudiantes del tercer año de la Facultad de Odontología de la UNICA, a pesar que en su curricula llevan metodología de investigación en un solo semestre, son los que fomentan hacer trabajos en beneficio de la facultad • Tanto los alumnos de primer año como el de segundo, tienen un nivel de conocimientos y actitudes es parecido; no existen diferencias significativas. A diferencia de los alumnos de tercero que a pesar que tienen conocimientos de investigación en su mayoría no lo aplican • El nivel de inquietud de los alumnos del primer al tercer año , es que solicitan que exista una oficina que se dedique a promocionar la investigación • El desconocimiento entre alumnos del sexo masculino y del sexo femenino, no existe diferencia significativa sin embargo el nivel de actitudes de cumplir ciertos procedimientos, las mujeres tienen mejores niveles de aplicación. • Con estos resultados hemos logrado nuestros objetivos y comprobado nuestra hipótesis.
----	---	--	-------	-------	-------	--